

Xn



NOCIVO

- Nocivo por ingestión.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Úsense guantes adecuados.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE, MUÉSTRELE LA ETIQUETA)

ANTÍDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MÉDICO EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

- Síntomas de intoxicación:
- Irritación de piel y mucosas.
- Náuseas, vómitos y diarreas.
- Alteraciones del sistema nervioso central.
- Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: NO PROVOQUE EL VÓMITO.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

- Recomendaciones al médico:
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: TELÉFONO 91 562 04 20

- Clasificaciones para la fauna: Mamíferos: A
Aves: A
Peces: A

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO


NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



 **Dow AgroSciences**
BIM*



FUNGICIDA
Polvo mojable (WP)

BIM es un fungicida sistémico para el control de la “fallada del arroz” (*Pyricularia oryzae*)

COMPOSICIÓN: Triciclazol 75% p/p

Fecha de fabricación y lote: ver envase

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Contenido Neto: 1 kg e (2 x 0,5 Kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el N° 15.832/10 por:

Dow AgroSciences Ibérica S.A.

C/ Ribera del Loira 4-6

Edificio Iris, 4ª planta

28042 MADRID

Tel. 91 740 77 00




**BOLSITAS HIDROSOLUBLES:
PRECAUCIONES PARTICULARES**
No abrir nunca las bolsas hidrosolubles y seguir las siguientes indicaciones:



No manipular las bolsas hidrosolubles con manos/guantes mojados.



Asegurar que la cuba esté perfectamente limpia y posteriormente llenarla con agua hasta 1/3 de la capacidad.



Echar el producto en la cuba. Esperar unos minutos con las bolsas en reposo en la cuba.



Poner el agitador en marcha hasta la completa disolución de las bolsas y el producto.



Terminar de llenar la cuba con agua o con otros posibles productos que se vayan a mezclar sin dejar de agitar.

ALMACENAMIENTO:
Si quiere guardar el producto para aplicaciones posteriores, selle siempre las bolsas, para impedir la entrada de humedad y conservar el producto en perfectas condiciones. No conservar las bolsitas hidrosolubles en lugares húmedos.

BIM* es un fungicida de aplicación foliar con excelente acción preventiva contra la fallada del arroz. Así mismo, tiene acción curativa cuando se aplica dentro de las 24 horas siguientes a la infección.

La acción preventiva del producto dura, aproximadamente, 3 semanas.

BIM es rápidamente absorbido por los tejidos del arroz y traslocado hacia el extremo de la hoja, siendo transportado a través del xilema. Este movimiento sistémico del producto asegura una total protección, incluso en las zonas del vegetal que no han sido perfectamente cubiertas.

CÓMO DEBE APLICARSE: Aplicar en pulverización normal.

BIM debe ser perfectamente mezclado con agua antes de la aplicación, ésta se puede realizar con todo tipo de pulverizadores que aseguren una distribución uniforme sobre toda la superficie de los órganos aéreos de las plantas tratadas.

MOMENTO Y DOSIS DE APLICACIÓN:

Pyricularia en hojas: aplicar 300 g/ha de producto, haciendo la aplicación dentro de las 24 horas siguientes a la infección. En caso de infecciones repetidas, es necesario hacer una nueva aplicación de BIM, a los 20 días de la primera.

Pyricularia en cuello y espigas: aplicar 300 g/ha de producto en estado de zurrón, es decir, inmediatamente antes de aparecer las primeras espigas; hacer una segunda aplicación a los 20 días de la primera.

PLAZO DE SEGURIDAD PARA LA RECOLECCIÓN O ENTRADA DE GANADO: 15 días.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

* Marca registrada de Dow AgroSciences

* Marca registrada de Dow AgroSciences